

# 《神经系统模块》（临八卷 A）

## 模拟练习

2024. 7

！！声明：严禁盈利传播！！

一、X型题（不定项选择题，每道题下面均有五个备选答案，其中至少有一个备选答案是正确的，请将正确的答案挑选出来，并在显示器选择相应的答案或在答题卡上相应位置涂黑，以示正确回答。多选或少选均不得分。）

1. 左侧舌咽神经麻痹，发“啊”音时悬雍垂偏向  
A. 偏向左侧 B. 正中 C. 不受影响  
响 D. 偏向右侧

试题答案： D (此题满分： 1 分)

2. 男性, 48岁, 因肢体瘫2天住院, MRI报告: 右侧桥脑有一个低信号病灶, 该患者临床可能有下列哪些表现:

  - A. 左偏瘫
  - B. 右外展神经麻痹
  - C. 右面神经瘫痪
  - D. 视觉障碍
  - E. 右偏瘫

试题答案： A, B, C (此题满分： 1 分)

3. 女 20 岁，东西掉到地上就会联想到地上有死鼠，因此东西被死为手也被沾污，一遍遍的洗手，至少洗半小时，也知道没道理，但了，病期一年可能有哪些症状？

  - A. 强迫意向
  - B. 强迫联想
  - C. 强迫仪式动作
  - D. 强迫洗涤
  - E. 强迫检查

试题答案：B、D（此题满分：1分）

4. 脊髓髓内病变早期易出现下列临床症状：

  - A. 根性疼痛
  - B. 大小便障碍
  - C. 脊髓半切症
  - D. 分离性障碍
  - E. 感觉障碍呈下行性发展

试题答案： B, D, E (此题满分： 1 分)

5. 用笔筒光从侧面照射右眼, 仅左侧瞳孔缩小, 再用笔筒光从侧面照射左眼, 双侧瞳孔均无反应, 病变在:

- A. 右侧动眼神经  
B. 左侧动眼神经  
C. 左侧视神经  
D. 右侧视神经  
E. 右滑车神经

试题答案: A, C (此题满分: 1分)

**！！声明：严禁盈利传播！！**

6. 男 30 岁诊断格林巴利综合症, 病后第 1 天出现复视, 双眼对光反射迟钝, 第 3 天发现双眼视乳头水肿, 第 5 天双下肢无力, 2 天内发展到双上肢无力, 呈弛缓性瘫, 肌力 2-3 级。第 12 天腰穿脑脊液蛋白 100mg/dl. 细胞数 5 个/dl, 感觉正常, 病人下列症状中什么是不常见的

- A. 瘫痪由下向上发展  
B. 对光反射迟钝  
C. 第 10 天脑脊液改变  
D. 视乳头水肿  
E. 双侧面瘫

试题答案: B, D (此题满分: 1分)

7. 脑血栓形成可分为

- A. 完全性中风  
B. 不完全性中风  
C. 进展性中风  
D. 缓慢性中风  
E. 急性中风

试题答案: A, C (此题满分: 1分)

8. 以下那些是帕金森病的临床表现:

- A. 意向性震颤  
B. 静止性震颤  
C. 面具脸  
D. 慌张步态  
E. 小写症

试题答案: B, C, D, E (此题满分: 1分)

9. 动脉粥样硬化好发于

- A. 颈内动脉起始部及虹吸部主干  
B. 大脑中动脉  
C. 大脑前动脉在胼胝体膝部绕行处脚绕行处  
D. 大脑后动脉在大脑  
E. 基底动脉下部

试题答案: A, B, C, D, E (此题满分: 1分)

10. 男性患者, 行走时有如踩棉花感, 踏地过重呈“跨阈步态”, 黑暗中上述症状更明显, 临床诊断感觉性共济失调, 根据的临床表现还有下列哪些:

- A. 睁眼时 Romberg 征不明显  
B. 闭目时共济失调明显
  - C. 震颤觉及关节位置觉丧失  
D. 震颤觉及关节位置存在
  - E. 肌张力增高

试题答案： A, B, C (此题满分： 1分)

！！！ 声明：严禁盈利传播！！！

**二、简答题** (根据提问, 请简要回答下列问题。 )

### 11. 中毒性精神病的诊断依据?

试题答案： 1. 有理由推断精神障碍是由进入体内的有害物质所引起； 2. 临床表现有中毒、智能障碍、精神病性症状，情感障碍、神经病性症状和人格改变等； 3. 精神活动能力和社会功能下降或丧失。

(此题满分: 6分)

## 12. 试述脑梗死急性期的治疗原则

试题答案：

1. 一般处理
2. 控制血压
3. 增加脑血流量, 改善脑血液循环
- 4) 血液稀释疗法
- 2) 血管扩张剂的使用
4. 抗血栓疗法: 1) 抗凝剂
- 2) 溶血栓剂
5. 控制脑水肿
6. 其它治疗: 1) 脑代谢活化剂
- 2) 脑保护剂
- 3) 其他病因治疗
- 4) 高压氧舱治疗
- 5) 中草药
7. 手术治疗

(此题满分: 6分)

13. 患者，男 46 岁，因左肋缘疼痛 6 月余，左下肢无力 1 月入院。查体：左肋缘区痛觉减退，右脐以下痛觉减退，左趾部位觉减退，左下肢肌力 2 级，伴肌张力增高，腱反射亢进，左侧 Babinski 征(+)。

请讨论定位诊断及进一步检查的方法。

试题答案：定位在左侧胸 8 脊髓节段的脊髓半横贯损害，硬膜下髓外的可能性较大。（br）根据①左肋缘疼痛（br）②左肋缘区痛觉减退（br）③右肢以下痛觉减退（br）定位在左胸 8 有 Broun-Sequard 综合征表现。左下肢中枢性瘫痪，左下肢深感觉减退，右下肢感觉减退，故为髓外。（br）进一步检查方法，①脊柱以胸 5/6 为中心照片，了解骨质改变；（br）②腰穿并作 Queckenstedt 试验了解有无椎管梗阻，脑脊液有无蛋白增加；（br）③椎管造影或 MR，了解病

变的准确部位和可能的性质。 (br)

(此题满分: 6 分)

**！！声明：严禁盈利传播！！**

14. 内囊病变的三偏综合症包括哪些症状?

试题答案:

1、偏瘫；2、偏盲；3、偏身感觉障碍。

(此题满分: 6 分)

15. 请列举临床最常见的 3 种原发性头痛

试题答案:

偏头痛，丛集性头痛，紧张型（性）头痛

(此题满分: 6 分)

16. Summarize the clinical manifestations of Wallenberg syndrome

试题答案: Loss of pain and temperature SENSATION in the ipsilateral face and contralateral body; ipsilateral HORNER SYNDROME; ipsilateral ATAXIA; DYSARTHRIA; VERTIGO; nausea, hiccup; dysphagia; and VOCAL CORD PARALYSIS.

(此题满分: 6 分)

17.

癫痫发作有哪些类型?

试题答案:

- (1) 部分性发作: 单纯部分性发作 (0.5 分), 复杂部分性发作 (0.5 分), 部分性发作继发为全面性发作 (0.5 分)。
- (2) 全面性发作: 失神发作, 肌阵挛发作, 阵挛性发作, 强直性发作, 全面强直一阵挛发作, 失张力性发作 (该项每答对 1 项可得 0.5 分, 答对 5-6 项可评 2.5 分)。

(此题满分: 6分)

## ！！声明：严禁盈利传播！！

18. 试述重症肌无力患者肌无力危象的处理

- 试题答案:
1. 维持呼吸道通畅
  2. 对肌无力危象者先肌注新斯的明然后渐改为口服剂
  3. 如出现胆碱能危象者应即停用抗胆碱酯酶剂。并静注阿托品，直至腾喜龙试验阳性后，再给适量口服剂
  4. 视情况气管切开辅助呼吸
  5. 抗感染予静脉补液，维持水、电解质平衡
  6. 血浆交换疗法
  7. 大剂量丙球静脉滴注

(此题满分: 6分)

三、 病例分析题 (根据下面的案例的要求, 请对该案例做出分析解答)

19.

病史简介:

患者女性, 65岁, 有高血压10年, 糖尿病8年, 因突发右侧肢体无力并言语不清2小时入院。患者晚上看电视时突发右侧肢体无力, 站立不能, 言语含糊不清, 不伴头痛、恶心, 二便正常。入院后查体: 神志清醒, 血压170/96mmHg, 混合性失语, 右侧鼻唇沟浅, 伸舌右偏, 右上、下肢肌力0级, 肌张力低, 腱反射减弱, 右侧Babinski征阴性。头颅CT未见明显异常密度影。

请讨论: 1、定位诊断及定性诊断?

2、诊断与鉴别诊断?

3、提出进一步检查及治疗方案?

试题答案:

请讨论:

定位诊断及定性诊断?

**定位诊断:** 患者因言语不能, 右侧肢体无力 3 小时入院, 病灶位于左侧大脑半球, 根据查体: 言语不能, 双眼向左侧凝视(大脑半球缺损病灶双眼向病灶侧凝视), 右侧中枢性面舌瘫, 右侧肢体肌力 0 级, 肌张力降低, 腱反射减弱, 右侧下肢病理征可疑。定位于前循环病变(颈内动脉系统)。(2)

**定性诊断:** 根据患者为中老年女性, 突发起病; 右侧肢体肌力为 0 级, 无意识障碍, 头颅 CT 未见高密度影, 排除脑出血, 定性为缺血性脑血管病(脑梗死或脑栓塞)。(2)

**诊断与鉴别诊断?**

**诊断:** 急性脑梗死(脑血栓形成) (1)

**鉴别诊断:** 1. 脑出血: 头颅 CT 未见高密度影。 (1)

2. 脑栓塞: 有心房纤颤病史, 无高血压等脑血管粥样硬化等高危因素, 突发起病, 较快到达症状高峰。(1)

**提出进一步检查及治疗方案?**

**进一步检查:** 头颅 MRI 及 MRA(DWI), DSA、心电图、血生化(血糖、血脂、尿酸、同型半胱氨酸等高危因素)、凝血功能, 心脏彩超。(2)

**治疗方案:**

**对症治疗:** (2)

1. 缺血性卒中后血压升高通常不需要紧急处理, 病后 24~48 小时收缩压>220、舒张压>120 或平均动脉压>130 时可用降压药, 切忌过度降压使脑灌注压降低, 导致脑缺血加剧; 准备溶栓血压控制在 180/100 以下。

2. 意识障碍和呼吸道感染者宜选用适当抗生素控制感染, 保持呼吸道通畅、吸氧和防治肺炎、预防尿路感染和褥疮等;

3. 心电监测

4. 血糖控制在 6~9mmol/L, 如>10mmol/L 宜给予胰岛素治疗
5. 营养支持。

特异性治疗: (3)

1. 静脉溶栓: 尿激酶、重组组织型纤溶酶原激活物, CT 未显示低密度灶, 已排除颅内出血; 患者本人或家属同意。
2. 血管内介入治疗: 可在 DSA 直视下进行超选择介入动脉溶栓、机械取栓等治疗。
3. 抗血小板治疗: 阿司匹林 100~300mg/d, 但溶栓 24 小时复查头颅 CT 未见脑出血后应用。
4. 脑保护治疗: 自由基清除剂、兴奋性氨基酸受体阻滞剂等。药物可用胞二磷胆碱、依达拉奉。

5. 早期康复治疗。

外科治疗: (1)

脑疝形成征象者, 开颅去骨瓣减压术

(此题满分: 12 分)

**!! 声明: 严禁盈利传播!!**

四、A1型题 (单句型最佳选择题。每一道考题下面均有五个备选答案。在答题时, 只需从中选择一个最合适答案, 并在显示器选择相应的答案或在答题卡上相应位置涂黑, 以示正确回答。)

20. 一女性, 48岁, 有既往亚急性心内膜炎病史, 突发意识模糊右上肢及嘴抽搐, 且发热, 听诊心脏音增强, 首先应怀疑:
- |            |        |         |
|------------|--------|---------|
| A. 脑出血塞    | C. 脑栓塞 | B. 心肌梗塞 |
| D. 蛛网膜下腔出血 | E. 脑膜炎 |         |

试题答案: C (此题满分: 0.5 分)

21. 不协调性精神运动性兴奋常见于哪种精神疾病?
- |                    |      |
|--------------------|------|
| A. 急性应激反应(急性心因性反应) | B. 癫 |
|--------------------|------|

D. 精神分裂症  
精神障碍

试题答案： D (此题满分： 0.5 分)

！！声明：严禁盈利传播！！

22. 抗癫痫药物治疗癫痫的原则是

- A. 大量、突击、静脉用药
- B. 按发作类型短期用药，随时改变品种
- C. 按发作类型长期、规则用药
- D. 选择不同作用机制药物，长期、规则、联合治疗
- E. 大剂量、短期、合并用药

试题答案： C (此题满分： 0.5 分)

23. 关于帕金森病步态描述正确的是

- A. 联带运动减少
- B. 鸭步
- C. 醉酒步态
- D. 走路快
- E. 身体后倾易跌倒

试题答案： A (此题满分： 0.5 分)

24. 周期性麻痹的严重病例应给予

- A. 10%氯化钾 10ml 静脉注射
- B. 10%氯化钾 10ml 加 50%葡萄糖 20ml 静脉注射
- C. 10%氯化钾 30ml 加生理盐水 1000ml 静脉滴注
- D. 10%氯化钾 10ml 加 5%葡萄糖 500ml 正规胰岛素 6u 静脉滴注
- E. 10%氯化钾 10ml 每日三次口服

试题答案： C (此题满分： 0.5 分)

25. 以下哪项不符合典型多发性硬化的临床特点：

A. 中枢神经系统多发病灶  
B. 视觉诱发电位异常  
C. 病情持续进展  
D. 多在感染后或疫苗接种后发病  
E. 磁共振 T2 加权像可见脑室周围多发高信号病灶

试题答案： D (此题满分： 0.5 分)

26. 周期性麻痹的常见病因是

- A. 低钙
- B. 低镁
- C. 低钠
- D. 低钾
- E. 低氯

试题答案: D (此题满分: 0.5 分)

**！！声明：严禁盈利传播！！**

27. 脊髓休克的临床表现是:

- A. 全身冷汗
- B. 血压下降
- C. 巴彬斯基氏征阳性
- D. 截瘫, 腱反射消失
- E. 意识模糊

试题答案: D (此题满分: 0.5 分)



28. 男性, 41岁, 近半年来, 反复发生左上肢抽搐, 每次半分钟左右自行缓解, 应考虑:

- A. 单纯部分性癫痫发作
- B. 肌阵挛发作
- C. 自动症
- D. 小舞蹈病
- E. 低钙抽搐

试题答案: A (此题满分: 0.5 分)

29. 对于多发性硬化患者, 下列哪项实验室检查是不恰当的:

- A. 头颅 MRI 检查;
- B. 腰穿脑脊液检查;
- C. 诱发电位检查;
- D. 头颅 CT 检查;
- E. 自身免疫血清学检查

试题答案: D (此题满分: 0.5 分)

30. 蛛网膜下腔出血最常见的原因是

- A. 先天性脑底动脉瘤
- B. 颅脑外伤
- C. 血液病
- D. 血管畸形
- E. 动脉粥样硬化

试题答案: A (此题满分: 0.5 分)

31. 脊髓休克期时临床会出现；

- A. 血压下降 B. 昏迷 C. 大小便失禁 D. 深反射减弱或消失 E. 心率加快

试题答案： D (此题满分： 0.5 分)

！！声明：严禁盈利传播！！

32. 蛛网膜下腔出血体征方面最主要的是：

- A. 一侧颅神经麻痹  
B. 脑膜刺激  
征  
C. 偏瘫  
D. 玻璃体下片状出血  
E. 某一肢体轻瘫或感觉障碍

试题答案： B (此题满分： 0.5 分)

33.6. 多发性硬化的临床表现不包括：

- A. 中青年多发; B. 病程中有缓解复发的特征;
  - C. 头颅 MRI 大多无异常发现; D. 可出现寰克隆带; E. 可有视力改变

试题答案： C (此题满分： 0.5 分)

### 34. 原发性癫痫是

- A. 从婴儿期开始癫痫发作
  - B. 癫痫发作，始终未能找到其器质性或代谢性病因者
  - C. 大发作及小发作
  - D. 除局限性发作以外所有类型的癫痫
  - E. 因大脑半球病变引起的癫痫发作

试题答案： B (此题满分： 0.5 分)

35. 男, 60岁, 晨起床时觉右上. 下肢麻木, 但可以自行上厕所, 回至卧室因右下肢无力摔倒. 检查: 神志清楚、右侧偏瘫. 其最可能的诊断是:

- A. 脑出血  
B. 脑栓塞  
C. 蛛网膜下腔出血  
D. 脑挫伤  
E. 脑血栓形成

试题答案： E (此题满分： 0.5 分)

36. A 67-year-old woman with a history of type 2 diabetes mellitus and atrial fibrillation presents to the emergency room with left body weakness and slurred speech. The onset was sudden while she was brushing her teeth 1 h ago, and she was brought immediately to the emergency room. She denies word-finding difficulties, dysesthesia,

and headache. She is taking warfarin. Physical exam findings include blood pressure of 205/90mmHg and irregular heartbeat. There is left side neglect with slurred speech. There is a corticospinal pattern of weakness of the left body, with the face and upper extremity being worse than the lower extremity. Routine chemistries and cell counts are normal. Her INR is 1.8. Which of the following is the most appropriate first step in management?

- a. Administer tissue plasminogen activator
- b. Call a vascular surgery consult for possible endarterectomy
- c. Order a brain CT
- d. Order a cerebral angiogram
- e. Start heparin

试题答案: C (此题满分: 0.5 分)

！！声明：严禁盈利传播！！

37. 有关对阿尔茨海默病的描述, 不正确的是( )

- A、有记忆障碍和全面的智能减退
- B、是老年期痴呆中最主要疾病之一
- C、早期可出现人格改变
- D、早期可出现幻觉妄想
- E、Hachinski 缺血评分量表 6 分

试题答案: E (此题满分: 0.5 分)

38. 女, 40岁, 突然头痛, 左上睑下垂, 不能睁开, 左眼球外展位, 不能向上、下、内转动, 瞳孔扩大, 直接、间接对光反射消失, 病变损害了

- A. 左侧面神经
- B. 左动眼神经
- C. 左视神经
- D. 左侧三叉神经
- E. 左侧外展神经

试题答案: B (此题满分: 0.5 分)

39. 运动系统检查不包括

- |        |          |       |        |
|--------|----------|-------|--------|
| A. 肌容积 | B. 肌张力   | C. 肌力 | D. 腱反射 |
| 射      | E. 不自主运动 |       |        |

试题答案: D (此题满分: 0.5 分)

40. 女性, 20岁, 半年来双侧手麻木, 入浴时, 不知冷热, 不能用手做活, 握力也减弱, 双侧小鱼际肌和骨间肌明显萎缩, 双侧膝反射亢进, 双侧前臂和手部感觉减退而深感觉正常, 其它部位感觉正常, 病灶在

- A. 上部颈髓腹侧                            B. 上部颈髓中  
央    C. 下部颈髓双外侧  
D. 下部颈髓中央                            E. 上部颈髓双外侧

试题答案: D (此题满分: 0.5分)

41. 下列何种疾病是面神经炎?

- A. 格林巴利综合症时出现的双侧周围性面瘫  
B. 面神经管邻近结构病变时出现的周围性面瘫  
C. 茎乳孔以上面神经管内急性非化脓性炎症  
D. 继发腮腺手术所出现的周围性面瘫  
E. 以上都是

试题答案: C (此题满分: 0.5分)

！！声明：严禁盈利传播！！

42. 男 18岁感冒后 8天出现双侧面肌无力, 病后十天检查为双侧周围性面瘫余无异常, 为确诊, 下列检查最有意义为何?

- A. 血糖                                      B. 脑电图                                    C. 腰穿                                      D. 电变性  
检查    E. 肌电图

试题答案: C (此题满分: 0.5分)

43. 强迫观念是指:

- A. 某一观念或概念多次重复出现于患者的思想, 明知没必要, 无意义也无法摆脱, 伴有主观的被迫感和痛苦感  
B. 思潮不受病人的意愿支配, 强制性的大量涌现于脑内, 内容往往杂乱无章, 常突发突止  
C. 患者常重复他所说的一句话的最末几个字或词, 虽然意识到没有必要, 但自己不能克服  
D. 患者机械而呆板地重复某一无意义的词或句子  
E. 受强烈情绪的影响和加强, 并在思维活动中任主导地位的观念

试题答案: A (此题满分: 0.5分)

44. 58岁男性, 突然右眼失明, 左上肢无力, 2天后右眼视力好转, 但左侧肢瘫加重, 查体: 血压 15 / 12kPa, 意识清, 左侧中枢性面舌瘫, 左侧上下肢瘫, 左偏身感觉障碍, 其阻塞血管

- A 右侧大脑中动脉皮层支  
B 右侧大脑中动脉深穿支

- C 右侧大脑中动脉主干
- D 右侧大脑前动脉深穿支
- E 右侧颈内动脉

试题答案: E (此题满分: 0.5 分)

45. 对多数蛛网膜下腔出血, 防止再出血的根本方法是

- A 卧床休息 4~6 周
- B 保持大便通畅
- C 不再从事剧烈运动或重劳动
- D 保持血压稳定
- E 对先天性动脉瘤或脑血管畸形行手术治疗

试题答案: E (此题满分: 0.5 分)

**！！声明：严禁盈利传播！！**

46. 右侧中枢性舌肌瘫痪的表现有:

- A. 伸舌偏向病灶同侧
- B. 伸舌偏向病灶对侧
- C. 左侧舌肌萎缩及纤颤
- D. 右侧舌肌萎缩及纤颤
- E. 伸舌无偏斜

试题答案: A (此题满分: 0.5 分)



47. 患者突然意识丧失, 全身抽搐, 面色发绀, 口吐白沫, 小便失禁, 5~6 分钟后意识逐渐清醒。可能是

- A 癫痫
- B 舞蹈病
- C 癫痫
- D 震颤麻痹
- E 手足搐搦症

试题答案: C (此题满分: 0.5 分)

48. 提睾反射的反射中枢是在

- A. 胸 11~12
- B. 腰 1~2
- C. 腰 3~4
- D. 骶 1~2
- E. 骶 4~5

试题答案: B (此题满分: 0.5 分)

49. 脊髓压迫症最常见的病因是

- A. 脊椎疾病
- B. 脊髓髓内肿瘤
- C. 椎管内脊髓外肿瘤
- D. 急性脊髓炎
- E. 脊髓空洞症

试题答案: B (此题满分: 0.5 分)

**！！声明：严禁盈利传播！！**

50. 左侧偏瘫, 右侧外展神经麻痹和右侧面神经周围性麻痹病变部位在

- A. 右内囊
- B. 右中脑
- C. 右脑桥
- D.
- 左脑桥
- E. 左中脑

试题答案: C (此题满分: 0.5 分)

51. 高血压脑出血最常见的发病部位是

- A. 丘脑区
- B. 桥脑
- C. 基底节
- D. 额叶
- E. 小脑

试题答案: C (此题满分: 0.5 分)

52. 帕金森病的 3 个主要临床特征是

- A. 面具脸、静止性震颤、运动减少
- B. 静止性震颤、运动减少、病理反射
- C. 静止性震颤、慌张步态、肌张力增高
- D. 静止性震颤、运动减少、肌张力增高
- E. 慌张步态、肌张力增高、写字过小症

试题答案: D (此题满分: 0.5 分)

53. 心源性脑栓塞时, 栓塞多发生在

- A 大脑前动脉
- B 大脑中动脉
- C 大脑后动脉
- D 椎动脉
- E 基底动脉

试题答案: B (此题满分: 0.5 分)

54. 关于抗精神病药物的治疗机理, 下述哪项正确?

- A. 抑制单胺氧化酶
- B. 阻断多巴胺受体
- C. 阻

- 断肾上腺素受体  
D. 阻断胆碱能受体                    E. 造成体内低血糖反应

试题答案: B (此题满分: 0.5 分)

**！！声明：严禁盈利传播！！**

55. 对急性期躁狂症患者为了迅速控制其急性躁狂症状, 可首选  
A. 锂盐                    B. 卡马西平                    C. 安定类                    D. 氯丙  
嗪                        E. 氯丙咪嗪

试题答案: D (此题满分: 0.5 分)

56. 脊髓休克见于  
A. 脊髓胶质瘤  
B. 脊髓蛛网膜粘连  
C. 急性横贯性脊髓炎  
D. 脊髓空洞症  
E. 脊髓后动脉血栓形成

试题答案: C (此题满分: 0.5 分)

57. 哪种症状常见于心因性精神障碍?  
A. 欣快症                    B. 情感倒  
错                            C. 情绪高涨                    D. 抑郁和焦虑                    E. 易激惹

试题答案: D (此题满分: 0.5 分)

58. A 27-year-old woman has been sad for the past two weeks. She is fatigued and has a hard time concentrating at work. Just a few weeks earlier she was energetic and enthusiastic, and was able to work 10 to 12 hours a day with little sleep and go dancing at night. Her husband wants a divorce because he is tired of “these constant ups and downs.” The most accurate diagnosis is ( )  
a. Borderline personality disorder  
b. Seasonal mood disorder  
c. Dissociative identity disorder  
d. Cyclothymia disorder  
e. Recurrent major depression

试题答案: D (此题满分: 0.5 分)

59. 多发性硬化的治疗措施中错误的是:

- A. 激素冲击治疗; B. B 族维生素营养神经; C. α 干扰素治疗; D. 对症治疗; E. 改善循环治疗

试题答案: A (此题满分: 0.5 分)

**！！声明：严禁盈利传播！！**

60. 脊髓圆锥病变和马尾神经根病变的临床症状的不同点是

- A. 有否椎体束征
- B. 有否下肢瘫痪
- C. 有否病理征
- D. 有否腹壁反射改变
- E. 有否括约肌障碍

试题答案: B (此题满分: 0.5 分)

61. 腔隙性脑梗塞纯运动性偏瘫表现为:

- A. 仅有偏瘫
- B. 偏瘫伴轻度客观感觉障碍
- C. 偏瘫伴失用
- D. 偏瘫伴视野缺损
- E. 偏瘫伴失语

试题答案: A (此题满分: 0.5 分)

62. 脊髓压迫症的特点不包括:

- A. 脊髓损害表现为横贯性损害征
- B. 奎肯试验部分或完全性梗阻
- C. 腰椎穿刺压力增高
- D. 脑脊液蛋白含量增高
- E. 脊柱 X 线片可见骨受压及破坏

试题答案: C (此题满分: 0.5 分)

63. 治疗急性脊髓炎首选药物是

- A. 抗生素
- B. 维生素
- C. 皮质类固醇激素
- D. 神经生长因子
- E. 血管扩张剂

试题答案: C (此题满分: 0.5 分)

64. 下列哪项不是检查共济运动方法?



试题答案： E (此题满分： 0.5 分)

！！！ 声明：严禁盈利传播！！！

65. With vitamin B<sub>12</sub> deficiency, which of the following accumulates in the blood?

- a. Cysteine
  - b. Methylmalonic acid
  - c. Methionine
  - d. Succinic acid
  - e. Propionic acid

试题答案： B (此题满分： 0.5 分)

66. 所谓脑出血或脑溢血，是指：

- A. 外伤及各种原因引起的颅内出血
  - B. 颅内肿瘤血管破裂引起的出血
  - C. 凝血功能异常引起的颅内出血
  - D. 凡腰穿脑脊液为血性者, 均可认为脑出血
  - E. 非外伤性脑实质内的出血

试题答案： E (此题满分： 0.5 分)

67. 哪项可能不是脊髓病变引起的瘫痪

- A 四肢上运动神经元性瘫痪
  - B 下肢上运动神经元性瘫痪
  - C 双上肢下运动神经元性瘫痪，双-肢上运动神经元性瘫痪
  - D 一侧上下肢上运动神经元性瘫痪
  - E 一侧上肢上运动神经元性瘫痪

试题答案: E (此题满分: 0.5 分)

68. 男性，26岁，突然出现抽搐，从一侧手指开始，向腕部、臂、肩部及半身扩展。诊断最大可能是

- A 全面强直-阵挛发作
  - B 精神运动性发作
  - C 失神发作
  - D 杰克逊(Jackson)癫痫
  - E 复杂部分性发作

试题答案: D (此题满分: 0.5 分)

69. 一患者发作性四肢抽搐 10 小时入院, 入院时意识不清, 约 10-20 分钟发作一次四肢抽搐, 首选的治疗为:

- A. 口服丙戊酸钠
- B. 肌注鲁米那钠
- C. 口服苯妥英钠
- D. 口服水合氯醛
- E 静注安定

试题答案: E (此题满分: 0.5 分)

**！！声明: 严禁盈利传播！！**

70. 哪一项不符合焦虑症流行学特征?(以我国调查资料为据)

- A. 患病率农村高于城市
- B. 多发病于 40 岁以上
- C. 女性多于男性
- D. 患病率 1.48%
- E. 是最常见的一类神经症

试题答案: C (此题满分: 0.5 分)

71. 典型偏头痛下列哪项是错误的: ( )

- A. 常出现视觉先兆
- B. 呈搏动性头痛
- C. 可致脑血栓形成
- D. 持续数小时至 10 余小时
- E. 睡眠后次日恢复正常

试题答案: A (此题满分: 0.5 分)

72. An 82-year-old woman with bilateral leg weakness has a greatly dilated abdominal aorta with a normal thoracic aorta. Which of the following is the most likely cause of this damage?

- a. Syphilis
- b. Trauma
- c. Chronic hypertension
- d. Diabetes mellitus
- e. Atherosclerosis

试题答案: E (此题满分: 0.5 分)

73. 下列哪项为锥体束损害的体征

- A Kemig 征
- B Lasegue 征
- C Romberg 征
- D Bmdzinski 征
- E Babinski 征

试题答案: E (此题满分: 0.5 分)

74. 吉兰巴雷综合症不应有的临床表现是

- A. 真性球麻痹
- B. 持续的膀胱直肠功能障碍
- C. 四肢软瘫
- D. 双侧周围性面瘫
- E. 四肢末端呈套式感觉障碍

试题答案: B (此题满分: 0.5 分)

**！！声明：严禁盈利传播！！**

75. 急性横贯性脊髓炎和格林-巴利综合征的鉴别点是

- A. 四肢瘫
- B. 腱反射消失
- C. 肌张力低
- D. 无病理征
- E. 括约肌障碍

试题答案: E (此题满分: 0.5 分)



76. 有关病毒性脑炎, 以下哪项不正确

- A 脑电图异常
- B 精神症状
- C 癫痫起病
- D 反复发作
- E 头颅 CT 可见弥漫性多个病灶

试题答案: D (此题满分: 0.5 分)

77. 一侧三叉神经脊束核的病损表现为

- A 同侧面部痛温, 触觉均障碍
- B 同侧面部呈现洋葱皮样分布的分离性痛温觉障碍
- C 同侧面部呈洋葱皮样分布的痛温觉及触觉障碍
- D 对侧面部呈洋葱皮样分布的痛温觉及触觉障碍
- E 咀嚼无力, 下颌反射消失, 张口时下颌向同侧偏斜

试题答案: B (此题满分: 0.5 分)

78. 精神分裂症病人表现:思维破裂, 扮鬼脸, 傻笑, 行为幼稚愚蠢, 常伴有冲动行为及本能意向亢进, 症状丰富易变, 片断而零乱的妄想, 病程发展快, 及时诊疗效果较好, 属于:

- A. 单纯型
- B. 青春型
- C. 偏执型
- D. 未定型
- E. 紧张型

试题答案: B (此题满分: 0.5 分)

79. 同向性偏盲病损位于

- A 同侧视神经
- B 视交叉
- C 对侧视束
- D 对侧颞叶视辐射
- E 对侧顶叶视辐射

试题答案: C (此题满分: 0.5 分)

**！！声明：严禁盈利传播！！**

DavidYR