

《精神神经病学》(精神卷期末 A)

模拟练习

2024. 6

！！声明：严禁盈利传播！！

一、A1型题 (单句型最佳选择题。每一道考题下面均有五个备选答案。在答题时, 只需从中选择一个最合适答案, 并在显示器选择相应的答案或在答题卡上相应位置涂黑, 以示正确回答。)

1. 症状性癫痫的 t 临床特点不包括
 - A. 发病与年龄有相关性, 有自愈倾向
 - B. 发作频繁
 - C. 脑电图局灶性异常多见
 - D. 一般有神经系统阳性体征
 - E. 神经影像学检查多发现异常

试题答案: A (此题满分: 1分)

！！声明：严禁盈利传播！！

2. 男, 70岁, 晨起时出现头晕、右侧肢体无力, 约半小时后症状完全消失。头颅 CT 检查正常。临床诊断为
 - A. 脑血栓形成
 - B. 短暂性脑缺血发作
 - C. 脑出血
 - D. 脑栓塞
 - E. 蛛网膜下腔出血

试题答案: B (此题满分: 1分)

3. 女性, 20岁, 半年来双侧手麻木, 入浴时, 不知冷热, 不能用手做活, 握力也减弱, 双侧小鱼际肌和骨间肌明显萎缩, 双侧膝反射亢进, 双侧前臂和手部感觉减退而深感觉正常, 其它部位感觉正常, 病灶在
 - A. 上部颈髓腹侧
 - B. 上部颈髓中
 - C. 下部颈髓双外侧
 - D. 下部颈髓中央
 - E. 上部颈髓双外侧

试题答案: D (此题满分: 1分)

4. 双侧旁中央小叶及其附近中央前后回受损引起

- A 下肢感觉障碍
- B 下肢瘫痪
- C 面舌及上肢感觉障碍
- D 面舌及上肢瘫痪
- E 痉挛性截瘫, 传导束性感觉障碍及尿潴留

试题答案: E (此题满分: 1分)

!! 声明: 严禁盈利传播!!

5. 脊髓休克见于

- A. 脊髓胶质瘤
- B. 脊髓蛛网膜粘连
- C. 急性横贯性脊髓炎
- D. 脊髓空洞症
- E. 脊髓后动脉血栓形成

试题答案: C (此题满分: 1分)

6. 男, 62岁, 2天前突然右眼黑矇, 左侧肢体无力, 约10分钟后恢复, 今日又有类似发作一次, 体检: 未发现

异常。血压150/90mmHg。依据临床表现, 病变定位于

- A. 颈内动脉
- B. 颈外动脉
- C. 大脑中动脉
- D. 大脑前动脉
- E. 大脑后动脉

试题答案: A (此题满分: 1分)

7. 高血压脑出血最常见的发病部位是

- | | | |
|-------|-------|--------|
| A. 丘脑 | B. 桥脑 | C. 基底节 |
| 区 | D. 额叶 | E. 小脑 |

试题答案: C (此题满分: 1分)

8. 急性横贯性脊髓炎是指

- A. 脊髓白质脱髓鞘或坏死所致的急性横贯性损害
- B. 椎管内占位病变而引起的脊髓受压
- C. 脊髓血管的发育异常
- D. 脊髓先天发育异常, 胚胎期神经管关闭不全
- E. 维生素B12缺乏引起的神经系统变性疾病

试题答案: A (此题满分: 1分)

9. 帕金森病的主要生化改变是

- A. 乙酰胆碱酯酶活力增加
- B. 乙酰胆碱含量减少
- C. 多巴脱羧酶含量减少
- D. 多巴胺含量减少
- E. 多巴胺含量增多

试题答案: D (此题满分: 1分)

！！声明：严禁盈利传播！！

10. 完全性动眼神经麻痹, 眼球位于

- A. 外上斜位
- B. 内下位
- C. 内收位
- D. 外下斜位
- E. 内上位

试题答案: D (此题满分: 1分)

11. 患肢可抬离床面, 但是不能对抗阻力, 其肌力为

- A. I 级
- B. II 级
- C. III 级
- D. IV 级
- E. V 级



试题答案: C (此题满分: 1分)

12. 脑梗死临床表现中, 不应有的症状或体征

- A 意识不清
- B 肢体瘫痪
- C 头痛
- D 抽搐
- E 脑膜刺激征

试题答案: E (此题满分: 1分)

13. 脑血栓形成最常发生于下列哪条动脉

- A 大脑前动脉
- B 颈内动脉
- C 大脑中动脉
- D 大脑后动脉
- E 椎基底动脉

试题答案: C (此题满分: 1 分)

14. 痉挛性偏瘫步态

- A 跨阈步态
- B 醉汉步态
- C 慌张步态
- D 划圈样步态
- E 剪刀样步态

试题答案: D (此题满分: 1 分)

！！声明：严禁盈利传播！！

15. 周期性麻痹病人反复发作后, 在发作间隙期的肌力多数

- A. 明显减退
- B. 减退, 伴肌肉明显萎缩
- 缩
- C. 正常
- D. 正常, 伴感觉减退
- E. 正常, 伴腱反射消失

试题答案: C (此题满分: 1 分)

16. 男性, 36岁, 突起昏迷, 四肢瘫痪, 双侧瞳孔“针尖样”缩小。其最可能的疾病是

- A 额叶出血
- B 脑桥出血
- C 小脑出血
- D 基底节出血
- E 蛛网膜下腔出血

试题答案: B (此题满分: 1 分)

17. 下列哪项化验指标对于鉴别肌源性疾病最有意义?

- A. CPK
- B. ALT
- C. AST
- D. LDH
- E. Dopa

试题答案: A (此题满分: 1 分)

18. 伴有眼外肌麻痹的颅底综合征是

- A. 颈静脉孔(Vernet)综合征
- B. 后破裂孔(Collet-Sicard)综合征
- C. 腮腺后间隙(Villaret)综合征

- D. 眼尖综合征
- E. Foster-Kennedy 综合征

试题答案: D (此题满分: 1分)

19. 下述哪项不符合震颤麻痹的症状

- A 面具脸
- B 慌张步态
- C 搓药丸样动作
- D 小写症
- E 动作时震颤加剧

试题答案: E (此题满分: 1分)

！！声明：严禁盈利传播！！

20. 基底动脉尖综合征是以什么为主要表现的一组临床综合征

- A. 脑桥病损
- B. 中脑病损
- C. 小脑病损
- D. 延髓病损
- E. 丘脑病损

试题答案: B (此题满分: 1分)



21. 关于脑出血的流行病学情况, 正确的是:

- A. 发病年龄常为 50-70 岁, 多有冠心病史, 夏天多发
- B. 常在 70 岁以上, 多有高血压病史, 寒冷季节多发
- C. 发病年龄常在 50-70 岁, 多有高血压病史, 寒冷季节多发
- D. 常在 40-60 岁间发病, 多有糖尿病史, 寒冷季节多发
- E. 常在 50-70 岁起病, 多有糖尿病史, 夏天多发

试题答案: C (此题满分: 1分)

22. 男, 55 岁。突发头痛、呕吐咖啡色液体, 伴左侧肢体无力, 迅速出现昏迷。既往有高血压病史。最可能的诊断是

- A. 脑血栓形成
- B. 脑出血
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 脑栓塞
- E. 多发性脑梗死

试题答案: B (此题满分: 1分)

23. 典型偏头痛下列哪项是错误的: ()

- A. 常出现视觉先兆
- B. 呈搏动性头痛
- C. 可致脑血栓形成
- D. 持续数小时至 10 余小时
- E. 睡眠后次日恢复正常

试题答案: A (此题满分: 1 分)

24. 短暂脑缺血发作的临床表现是

- A 血压突然升高, 短暂意识不清, 抽搐
- B 眩晕、呕吐、耳鸣持续一至数日
- C 发作性神经系统功能障碍, 24 小时内完全恢复
- D 昏迷、清醒、再昏迷
- E 一侧轻偏瘫, 历时数日渐恢复

试题答案: C (此题满分: 1 分)

！！声明：严禁盈利传播！！

25. 女性 40 岁, 四肢进行性无力 3 天入院, 第 5 天患者双侧 Bell's 征(+), 双口角下垂, 流口水, 查四肢肌力 3-4 级。反射低巴彬斯基征(-)脑脊液蛋白 100mg/dl 细胞数 5 个/mm³. 运动神经传导速度检查 M 波波低诊断考虑为:

- A. 脊髓灰质炎
- B. 多发性肌炎
- C. 病毒性脑炎
- D. 多发性硬化
- E. 格林巴利综合症

试题答案: E (此题满分: 1 分)

26. 周围性舌下神经麻痹的症状不包括

- A 一侧麻痹, 伸舌时舌尖偏向麻痹同侧
- B 一侧麻痹, 伸舌时舌尖偏向麻痹对侧
- C 两侧麻痹, 伸舌时受限或不能
- D 舌肌萎缩及伴有肌束震颤
- E 肌电图检查有变性反应

试题答案: B (此题满分: 1 分)

27. 患者, 男, 32 岁, 发作性头痛 5 个月, 每日发作 2-3 次, 多于夜间发作而痛醒, 表现为右侧眼眶强烈钻痛, 伴畏光, 流泪, 头痛于 10 分钟达高峰, 1 小时内可缓解。发作间期查体未见神经系统阳性体征。此患者的诊断首先考虑:

- A. 颅内占位病变
- B. 动脉瘤
- C. 丛集性头痛
- D. 癫痫
- E. 巨细胞动脉炎

试题答案: C (此题满分: 1 分)

28. 脊髓休克的临床表现是:

- A. 全身冷汗
- B. 血压下降
- C. 巴彬斯基氏征阳性
- D. 截瘫, 腱反射消失
- E. 意识模糊

试题答案: D (此题满分: 1分)

！！声明：严禁盈利传播！！

29. 癫痫的定义是

- A. 持续存在的神经系统症状
- B. 发作性抽搐
- C. 中枢神经系统内存在破坏病变
- D. 反复发作的神经元异常放电引起暂时性突发性大脑功能异常
- E. 突然神志丧失

试题答案: D (此题满分: 1分)

30. 患者, 男, 10岁, 诊断格林-巴利综合症, 病情进展快, 体温38°C, 烦躁, 呼吸浅快, 30次/分, 有三凹现象, 咳痰费力, 双下肺小水泡音, 心率90次/分, 律整, 四肢弛缓性瘫痪肌力2级, 余无异常, 当前应处理的主要问题:

- A. 肺部感染
- B. 精神症状
- C. 呼吸衰竭
- D. 发热
- E. 四肢运动障碍

试题答案: C (此题满分: 1分)

31. 多发性硬化的典型临床表现不常有:

- A. 发病年龄多在20-40岁之间
- B. 起病形式急或亚急性
- C. 可以有脊髓性感觉障碍
- D. 有视力障碍、复视
- E. 精神异常

试题答案: E (此题满分: 1分)

32. 典型脊髓半横断综合征(Brown-Sequard Syndrome)最常见于

- A. 脊前动脉闭塞
- B. 急性脊髓炎
- C. 脊髓急性硬膜外脓肿
- D. 脊髓髓外硬膜内肿瘤
- E. 脊髓空洞症

试题答案: D (此题满分: 1分)

33. Millard-Gubler 综合征的表现不包括

- A 本侧展神经瘫痪
- B 本侧面神经瘫痪
- C 对侧舌下神经瘫痪
- D 对侧上下肢上单位瘫
- E 眼球侧视运动障碍

试题答案: B (此题满分: 1分)

！！声明：严禁盈利传播！！

34. 哪项是单纯疱疹病毒性脑炎的特异性治疗:

- A. 阿昔洛韦
- B. 脱水
- C. 抗癫痫
- D. 激素
- E. 病毒唑

试题答案: A (此题满分: 1分)

35. Wernicke 失语, 其病变部位在主侧半球

- A. 额中回后部
- B. 额下回后部
- C. 颞上回后部
- D. 颞中回后部
- E. 颞下回后部

试题答案: C (此题满分: 1分)

36. TIA 的微栓子来源很多, 但与下列哪项无关:

- | | | |
|-----------|-----------|----|
| A. 心脏附壁血栓 | B. 下腔静脉血栓 | C. |
| 颈内动脉粥样硬化斑 | | |
| D. 颅内动脉血栓 | E. 以上都不是 | |

试题答案: B (此题满分: 1分)

37. 周期性麻痹的常见病因是

- A. 低钙
- B. 低镁
- C. 低钠
- D. 低钾
- E. 低氯

试题答案: D (此题满分: 1分)

38. 诊断帕金森病最重要的是

- A. 脑电图
- B. 临床表现
- C. 头颅 CT
- D. 家族史
- E. 脑脊液检查

试题答案: B (此题满分: 1分)

！！声明：严禁盈利传播！！

39. 怀疑脑栓塞患者,除了应作脑影像学检查外,哪项检查有参考意义:

- A. 头部超声波见中线波偏移
- B. 肾图示尿浓缩功能障碍
- C. 脑脊液淡红色
- D. 心电图异常
- E. 脑电图异常改变

试题答案: D (此题满分: 1分)

40. 男, 30岁, 长期饮酒, 近日戒酒后出现双上肢前伸时细小颤动, 无肌张力变化, 无步态和表情变化, 检查肝功正常。最可能的诊断是

- A. 青年型帕金森病
- B. 特发性震颤
- C. 甲亢
- D. 扑翼样震颤
- E. 以上都不是

试题答案: B (此题满分: 1分)

41. 左侧动眼神经麻痹, 右侧中枢性面、舌瘫及偏瘫, 病灶定位在

- A. 左侧内囊
- B. 右侧丘脑
- C. 左侧脑桥
- D. 左侧中脑
- E. 右侧中脑

试题答案: D (此题满分: 1分)

42. 男性, 39岁, 发作时先觉胃部一股气体上升, 并有咀嚼、吞咽动作, 喃喃自语, 走动, 似在找东西, 呼唤无反应, 持续约4分钟。最可能的发作类型是

- A. 强直一阵挛性发作
- B. 失神发作

- C. 复杂部分性发作
- D. 脑缺血发作
- E. 假性发作

试题答案: C (此题满分: 1分)

！！声明：严禁盈利传播！！

43. 男, 55岁, 1年前行胶质瘤手术。间断服用丙戊酸钠治疗, 今又再发四肢抽搐伴有尿失禁, 呼之不应、对疼痛刺激无反应近1小时急送医院, 最大的可能是
- A. 癫痫持续状态
 - B. 部分性发作继发全身性发作
 - C. 强直阵挛性发作
 - D. 癫痫发作后昏睡
 - E. 颅高压危象

试题答案: A (此题满分: 1分)

44. 高位截瘫病人排尿障碍表现为
- A. 尿失禁
 - B. 尿潴留
 - C. 无尿
 - D. 尿崩症
 - E. 少尿



试题答案: A (此题满分: 1分)

45. 男12岁,一周前感冒四天内进行性弛缓性四肢瘫,不能行走,感觉正常。检查还发现呼吸浅快,30次/分,心率100次/分偶有期前收缩,脸面表情差,有尿潴留,脑脊液正常。CNV检查M波幅降低,传导速度正常,此病人应该如何处理
- A. 暂不处理观察
 - B. 观察一周后复查腰穿
 - C. 按格林巴利综合症轻病人对待
 - D. 呼吸心电监护,按GBS重症处理
 - E. 按GBS重症处置作一般观察

试题答案: D (此题满分: 1分)

46. 有关病毒性脑炎,以下哪项不正确
- A. 脑电图异常
 - B. 精神症状
 - C. 癫痫起病

D 反复发作

E 头颅 CT 可见弥漫性多个病灶

试题答案: D (此题满分: 1 分)

！！声明：严禁盈利传播！！

47. 为明确脑栓塞病人病情具体情况(梗死的部位, 范围, 数值等)具有决定意义的检查是

- A. 脑电图 (CT, MRI)
B. 脑影像检查
C. 经颅多谱勒
D. 脑诱发电位
E. 脑血管造影

试题答案: B (此题满分: 1 分)

48. 结核性脑膜炎的以下哪项表述是错误的

- A、急性或亚急性起病
B、颈强、Kerning 征等脑膜刺激征明显
C、脑脊液细胞数、蛋白升高, 糖和氯降低
D、常用氟康唑、异烟肼、糖皮质激素等治疗
E、脑脊液离心沉淀涂片墨汁染色(-)

试题答案: D (此题满分: 1 分)

49. 单纯部分性发作与复杂部分性发作的主要区别在于有无:

- A、意识障碍
B、运动症状
C、感觉症状
D、Todd 瘫痪
E、精神症状

试题答案: A (此题满分: 1 分)

50. 卡马西平对癫痫疗效最好的类型是:

- A. 失神发作
B. 全身强直-痉挛性发作
C. 复杂部分性发作
D. 自主神经发作
E. 单纯部分性发作

试题答案: C (此题满分: 1 分)

51. 下列哪项不符合小舞蹈病的体征

- A 拇指外展征(Warner 征)
B 旋前肌征
C 盈亏征

- D 钟摆样膝反射
E 小写症

试题答案： E (此题满分： 1 分)

！！声明：严禁盈利传播！！

52. 男 46 岁, 近数年来进行性四肢无力, 并出现舌肌及上下肢肌萎缩, 伴肌束颤, 膝反射亢进, 双 Babinski 征阳性, 感觉正常, 该患者应进行哪一项检查?

试题答案： E (此题满分： 1 分)

53. 下列哪项不是下运动神经元

- A 脊髓前角细胞
 - B 前根
 - C 神经丛
 - D 周围神经系统
 - E 皮质脑干束

试题答案： E (此题满分： 1 分)

54. 癫痫大发作的特征是

- A. 发作性头痛
 - B. 发作性意识障碍
 - C. 发作性强直-阵挛动作及意识障碍
 - D. 发作性多动
 - E. 发作性偏瘫

试题答案： C (此题满分： 1 分)

55. 查体发现患者对别人和自己讲的话均不理解，发音清晰，语调正常，但错语较多，难以理解，最可能的失语类型是

- A Broca 失语 B Wernicke 失语 C 皮质下失语 D 传导性失语 E 命名性失语

试题答案： B (此题满分： 1 分)

56. 短暂性脑缺血发作的定义不包括

- A. 好发于 50~70 岁
 - B. 常反复发作，症状相对恒定
 - C. 每次发作持续数分钟至 1 小时，不超过 24 小时

- D. 可遗留神经功能缺损
- E. 男多于女

试题答案: D (此题满分: 1分)

！！声明：严禁盈利传播！！

57. 思维不连贯是指:

- A. 在意识清楚和无明显外界干扰等情况下, 言语突然停顿, 患者常形容为思路出现了空白
- B. 联想松弛严重, 不能完整地表达一个句子, 言语支离破碎
- C. 由于对概念的运用或判断推理的紊乱, 使词或句之间缺乏正常的联系, 失去了不同概念间的区别, 伴有正常语法结构的紊乱
- D. 是脑器质性或躯体疾病所致精神障碍中常见的一种联想障碍。表现为言语杂乱, 语句片断, 毫无主题可言
- E. 思维过程中主题连换中的粘滞性, 停留在某些枝节问题上而活人东拉西扯的印象

试题答案: D (此题满分: 1分)

58. 下列哪项不符合一侧动眼神经麻痹

- A 上脸下垂, 眼球不能向上、下和内侧转动
- B 眼球向上、内、向下注视时出现复视
- C 眼球向外呈外下方斜视
- D 瞳孔散大, 光反射消失, 调节反射存在
- E 瞳孔散大, 光反射及调节反射均消失

试题答案: D (此题满分: 1分)

59. Broca 失语, 其病变部位在主侧半球的

- A. 额中回后部
- B. 额下回后部
- C. 颞上回后部
- D. 颞中回后部
- E. 颞下回后部

试题答案: B (此题满分: 1分)

60. 一 27 岁年女性, 反复出现视力下降 1 年, 双下肢无力伴大小便障碍 1 周入院。查体: 视乳头苍白, 胸 6 平面以下感觉减退, 双下肢肌力 3 级, 病理征阳性。该患者可能的诊断为:

- A. 亚急性联合变性;
- B. 脊髓肿瘤;
- C. 视神经脊髓炎;
- D. 脊髓空洞症;
- E. 胶质瘤

试题答案: C (此题满分: 1分)

61. 脊髓休克常见于

- A. 脊髓肿瘤
- B. 急性脊髓炎
- C. 脊髓亚急性联合变性
- D. 脊髓空洞症
- E. 脊髓血管畸形

试题答案: B (此题满分: 1分)

62. 一侧颈内动脉闭塞, 可无临床症状, 是因为

- A 同侧颈外动脉未闭塞
- B 对侧颈内动脉未闭塞
- C 正常脑底动脉环可迅速建立侧支循环
- D 双侧椎动脉未闭塞
- E 颅内血管变异

试题答案: C (此题满分: 1分)

63. 患者出现口角右歪, 左眼不能闭合, 左侧额纹消失, 左侧鼻唇沟变浅, 其病变累及:

- A 右侧脑桥
- B 左侧中脑
- C 左侧大脑半球
- D 左侧面神经
- E 左侧内囊

试题答案: D (此题满分: 1分)

！！声明：严禁盈利传播！！

64. Horner 征瞳孔改变为

- A. 瞳孔缩小, 对光反射灵敏
- B. 瞳孔缩小, 对光反射消失
- C. 瞳孔扩大, 对光反射灵敏
- D. 瞳孔扩大, 对光反射消失
- E. 瞳孔没有改变

试题答案: A (此题满分: 1分)

65. 下述哪种药物具有预防躁狂发作的作用)

- A. 锂盐
- B. 氯硝安定

定

D. 阿米替林

C. 氯丙嗪

E. 氟哌啶醇

试题答案: A (此题满分: 1分)

66. 单纯部分性运动性癫痫的特征是:

- A. 轻微的抽搐发作 B. 身体某一部分发作性抽搐
C. 发作性头痛 D. 发作性多动 E. 发作性瘫痪

试题答案: B (此题满分: 1分)

67. 支持功能性头痛的描述有

- A. 反复发作性搏动性头痛, 睡眠后减轻, 间歇期正常
B. 癫痫发作
C. 视力减退
D. 晨起时加重伴喷射样呕吐
E. 有神经系统阳性体征

试题答案: A (此题满分: 1分)



68. 急性横贯性脊髓炎和格林-巴利综合征的鉴别点是

- A. 四肢瘫
B. 腱反射消失
C. 肌张力低
D. 无病理征
E. 括约肌障碍

试题答案: E (此题满分: 1分)

！！声明：严禁盈利传播！！

69. 舌咽迷走神经麻痹的临床表现不包括

- A 吞咽困难, 饮水呛咳
B 说话声音带鼻音
C 患侧软腭活动受限
D 患侧咽反射消失
E 舌前 2 / 3 味觉消失

试题答案: E (此题满分: 1分)

70. 癫痫下列哪项不符合

- A 按照病因可分特发性癫痫和症状性癫痫
B 遗传因素和环境因素均可影响痫性发作

- C 每一位癫痫患者只有一种发作类型
- D 女性患者通常在月经期和排卵期发作频繁
- E 癫痫的临床表现可分痫性发作和癫痫症两方面

试题答案: C (此题满分: 1 分)

71. 被看成是脊神经后根延长的只有运动根的颅神经是:

- A. 三叉神经
- 经
- B. 面神
- C. 吞咽神经
- D. 迷走神经
- E. 副神经

试题答案: E (此题满分: 1 分)

72. 单纯疱疹病毒性脑炎的特征性病理改变

- A. 小胶质细胞增生
- B. 淋巴细胞浸润
- C. 出血性坏死
- D. 巨噬细胞浸润
- E. 脱髓鞘

试题答案: C (此题满分: 1 分)

!! 声明: 严禁盈利传播!!

73. 男性, 26岁, 突然出现抽搐, 从一侧手指开始, 向腕部、臂、肩部及半身扩展。诊断最大可能是

- A 全面强直-阵挛发作
- B 精神运动性发作
- C 失神发作
- D 杰克逊(Jackson)癫痫
- E 复杂部分性发作

试题答案: D (此题满分: 1 分)

74. 发生于脊髓损害的肢体痛觉、温度觉缺失是由于病变侵犯

- A. 皮质脊髓侧束
- B. 脊髓丘脑侧束
- C. 薄束与楔束
- D. 红核脊髓束
- E. 脊髓小脑束

试题答案: B (此题满分: 1 分)

75. 急性横贯性脊髓炎和周期性瘫痪的临床表现鉴别点是

- A. 四肢瘫
- B. 腱反射消失
- C. 无病理征
- D. 肌张力低
- E. 有无传导束性感觉障碍

试题答案: E (此题满分: 1分)

！！声明：严禁盈利传播！！

76. 两足并拢站立闭目, 此项检查为

- A Laseque 征
- B Romberg 征
- C Kernig 征
- D Hoffmann 征
- E Babinski 征

试题答案: B (此题满分: 1分)

77. 以下关于结核性脑膜炎的描述正确的是

- A. 结核性脑膜炎的病理表现主要为颅底脑膜单核细胞渗出为主
- B. 结核性脑膜炎不易并发脑积水
- C. 典型的结核性脑膜炎脑脊液生化改变是蛋白增高, 糖氯化物正常
- D. 典型的结核性脑膜炎脑脊液常规改变是压力增高, 多核细胞增多
- E. 因易导致结核血行播散, 故结核性脑膜炎患者禁忌用激素治疗

试题答案: A (此题满分: 1分)

78. 格林—巴利综合症中最易受累的颅神经是

- | | |
|-----------|----------|
| A. 双侧外展神经 | B. 舌下神经 |
| 经 | C. 双侧面神经 |
| D. 滑车神经 | E. 听神经 |

试题答案: C (此题满分: 1分)

79. 鉴别肢体的中枢性和周围性瘫痪, 下列哪项无意义

- | | | | |
|--------|--------|-------|----------|
| A. 肌张力 | B. 肌萎缩 | C. 肌力 | D. 巴彬斯基氏 |
| 征 | E. 腱反射 | | |

试题答案: C (此题满分: 1分)

二、病例分析题 (根据下面的案例的要求, 请对该案例做出分析解答)

80.

病史简介:

患者女性, 65岁, 有高血压10年, 糖尿病8年, 因突发右侧肢体无力并言语不清2小时入院。患者晚上看电视时突发右侧肢体无力, 站立不能, 言语含糊不清, 不伴头痛、恶心, 二便正常。入院后查体: 神志清醒, 血压170/96mmHg, 混合性失语, 右侧鼻唇沟浅, 伸舌右偏, 右上、下肢肌力0级, 肌张力低, 腱反射减弱, 右侧Babinski征阴性。头颅CT未见明显异常密度影。

请讨论: 1、定位诊断及定性诊断?

2、诊断与鉴别诊断?

3、提出进一步检查及治疗方案?

！！声明：严禁盈利传播！！

试题答案:

请讨论:

定位诊断及定性诊断?

DavidYR

定位诊断: 患者因言语不能, 右侧肢体无力3小时入院, 病灶位于左侧大脑半球, 根据查体: 言语不能, 双眼向左侧凝视(大脑半球缺损病灶双眼向病灶侧凝视), 右侧中枢性面舌瘫, 右侧肢体肌力0级, 肌张力降低, 腱反射减弱, 右侧下肢病理征可疑。定位于前循环病变(颈内动脉系统)。(2)

定性诊断: 根据患者为中老年女性, 突发起病; 右侧肢体肌力为0级, 无意识障碍, 头颅CT未见高密度影, 排除脑出血, 定性为缺血性脑血管病(脑梗死或脑栓塞)。(2)

诊断与鉴别诊断?

诊断: 急性脑梗死(脑血栓形成)(1)

鉴别诊断: 1. 脑出血: 头颅CT未见高密度影。(1)

2. 脑栓塞：有心房纤颤病史，无高血压等脑血管粥样硬化等高危因素，突发起病，较快到达症状高峰。（1）

提出进一步检查及治疗方案？

进一步检查：头颅 MRI 及 MRA（DWI），DSA、心电图、血生化（血糖、血脂、尿酸、同型半胱氨酸等高危因素）、凝血功能，心脏彩超。（2）

治疗方案：

对症治疗：（2）

1. 缺血性卒中后血压升高通常不需要紧急处理，病后 24~48 小时收缩压 >220 、舒张压 >120 或平均动脉压 >130 时可用降压药，切忌过渡降压使脑灌注压降低，导致脑缺血加剧；准备溶栓血压控制在 180/100 以下。

- 
- 2. 意识障碍和呼吸道感染者宜选用适当抗生素控制感染，保持呼吸道通畅、吸氧和防治肺炎、预防尿路感染和褥疮等；
 - 3. 心电监测
 - 4. 血糖控制在 6~9mmol/L，如 $>10\text{mmol/L}$ 宜给予胰岛素治疗
 - 5. 营养支持。

特异性治疗：（3）

- 1. 静脉溶栓：尿激酶、重组组织型纤溶酶原激活物，CT 未显示低密度灶，已排除颅内出血；患者本人或家属同意。
- 2. 血管内介入治疗：可在 DSA 直视下进行超选择介入动脉溶栓、机械取栓等治疗。
- 3. 抗血小板治疗：阿司匹林 100~300mg/d，但溶栓 24 小时复查头颅 CT 未见脑出血后应用。
- 4. 脑保护治疗：自由基清除剂、兴奋性氨基酸受体阻滞剂等。药物可用胞二磷胆碱、依达拉奉。

5. 早期康复治疗。

外科治疗：（1）

脑疝形成征象者，开颅去骨瓣减压术

(此题满分: 5分)

！！声明：严禁盈利传播！！

三、 简答题 (根据提问, 请简要回答下列问题。)

81. 简述重症肌无力患者的临床特征

试题答案：为一部分或全身横纹肌软弱，异常易于疲劳；通常活动后加重休息后减轻，晨轻暮重。服抗胆碱酯酶药后好转，疲劳试验，腾喜龙试验阳性，重复频率电刺激阳性。

(此题满分: 5分)

82. 内囊病变的三偏综合症包括哪些症状？

试题答案：

1、偏瘫；2、偏盲；3、偏身感觉障碍。

(此题满分: 5分)

83. 重症肌无力的诊断要点是什么？

试题答案： 1. 肌无力症状呈波动性，活动后加重休息后减轻。具晨轻暮重的特点

2. 常见眼睑下垂其次颈项肌-呼吸肌-延髓肌群-四肢肌无力呈缓解复发
 3. 疲劳试验(+)
 4. 腾喜龙或新斯的明试验(+)
 5. 电刺激试验, 动作电位幅度很快衰减 10% 以上为阳性
 6. 给予抗胆碱酯酶药物治疗症状与体征很快缓解

(此题满分: 5分)

四、X型题（不定项选择题，每道题下面均有五个备选答案，其中至少有一个备选答案是正确的，请将正确的答案挑选出来，并在显示器选择相应的答案或在答题卡上相应位置涂黑，以示正确回答。多选或少选均不得分。）

84. 深反射包括

- A. 下颌反射 B. 膝反

射
D. 掌颏反射

C. 跟腱反射
E. 咽反射

试题答案: A, B, C (此题满分: 1分)

！！声明：严禁盈利传播！！

！！声明：严禁盈利传播！！

！！声明：严禁盈利传播！！

！！声明：严禁盈利传播！！

！！声明：严禁盈利传播！！

！！声明：严禁盈利传播！！

！！声明：严禁盈利传播！！

！！声明：严禁盈利传播！！

DavidYR