

！ ! 声明: 严禁盈利传播! !

## 精神神经病学 (影像、针推卷)

2024. 6

### 模拟练习

一、 A1型题 (单句型最佳选择题。每一道考题下面均有五个备选答案。在答题时, 只需从中选择一个最合适答案, 并在显示器选择相应的答案或在答题卡上相应位置涂黑, 以示正确回答。)

1. 大脑中动脉皮层支闭塞后引起的对侧偏瘫有什么特点

- A 不伴有颅神经瘫痪
- B 偏瘫以下肢为重
- C 为均等性轻偏瘫
- D 偏瘫以下肢较轻
- E 上下肢均为 0 级瘫

试题答案: D (此题满分: 1 分)

2. 左侧偏瘫, 右侧外展神经麻痹和右侧面神经周围性麻痹病变部位在

- A. 右内囊
- B. 右中脑
- C. 右脑桥
- D. 左脑桥
- E. 左中脑

试题答案: C (此题满分: 1 分)

3. 震颤麻痹递质替代疗法常用下列哪种药物

- A 安坦
- B 苯甲托品
- C 苯海拉明
- D 金刚烷胺
- E 左旋多巴

试题答案: E (此题满分: 1 分)

4. 急性横贯性脊髓炎是指

- A. 脊髓白质脱髓鞘或坏死所致的急性横贯性损害
- B. 椎管内占位病变而引起的脊髓受压
- C. 脊髓血管的发育异常
- D. 脊髓先天发育异常, 胚胎期神经管关闭不全
- E. 维生素 B12 缺乏引起的神经系统变性疾病

试题答案: A (此题满分: 1 分)

！ ! 声明: 严禁盈利传播! !

5. 腔隙性脑梗塞的直径一般不超过 (cm)

- A. 0.5cm      B. 1cm      C. 2.0cm      D. 25cm      E. 3.0cm

试题答案: C (此题满分: 1 分)

6. 男性, 70 岁, 晨起时, 右手活动不灵, 站立时右腿也感到沉重, 随后数小时病状逐渐加重, 手脚活动困难, 意识清楚未诉其他特殊不适。表现为右侧上、下肢瘫痪, 右半身感觉减退, 右同侧偏盲, 能说话。但时常说不出实物名称, 本人意愿不能很好地表达。左侧其余运动无障碍, 眼底视盘正常, 只有动脉硬化, 以下哪些血管供应可能发生损害

- A. 大脑前动脉      B. 大脑中动脉      C. 大脑后动脉  
D. 椎基底动脉      E. 前交通动脉

试题答案: B (此题满分: 1 分)

7. 癫痫全身性强直一阵挛发作持续状态是 A.

- 频繁的发作      B. 持续性意识障碍  
C. 反复发作的抽搐, 发作间期意识障碍不恢复      D. 频繁的发作伴有颅内压增高  
E. 大发作后有较长时间的昏睡

试题答案: C (此题满分: 1 分)

8. 女, 24 岁。感冒一周后右眼痛, 一天内视力由 1.5 降到 0.5。检查: 右侧视乳头发红, 边缘模糊, 有少量絮状渗物, 静脉淤血, 其余神经系统检查正常。视神经病变为:

- A. 视乳头水肿      B. 急性视乳头炎      C. 急性球后视神经炎  
D. 视神经萎缩      E. 以上都不是

试题答案: B (此题满分: 1 分)

9. 关于命名性失语的定义, 下列哪项正确:

- A. 不能说话      B. 丧失称呼人名及物名能力      C. 胡言乱语  
D. 很少说话      E. 说话不流利

试题答案: B (此题满分: 1 分)

10. 脊髓休克常见于

- A. 脊髓肿瘤  
B. 急性脊髓炎  
C. 脊髓亚急性联合变性

！！声明：严禁盈利传播！！

- D. 脊髓空洞症
- E. 脊髓血管畸形

试题答案: B (此题满分: 1 分)

11. 提睾反射的反射中枢是在

- A. 胸 11~12
- B. 腰 1~2
- C. 腰 3~4
- D. 骶 1~2
- E. 骶 4~5

试题答案: B (此题满分: 1 分)

12. 下运动神经元损害的体征包括有:

- A. 痉挛性瘫痪
- B. Babinski 征阳性
- C. 腱反射减退或缺失
- D. 腱反射亢进
- E. 受累肌肉由于废用而轻度萎缩

试题答案: C (此题满分: 1 分)

13. 患者某日突然出现阵发性抽搐, 表现意识丧失, 眼球上窜, 瞳孔散大, 口唇青紫, 全身抽搐, 有舌咬伤, 持续约 3 分钟。发作后入睡, 意识清醒后对上述情况不能回忆。初步考虑为

- A. 癫痫痉挛发作
- B. Jackson 癫痫
- C. 去大脑强直
- D. 癫痫全面—强直阵挛发作
- E. 震颤麻痹

试题答案: D (此题满分: 1 分)

14. 28 岁女性, 跳舞时突感剧烈头痛、呕吐, 检查脑膜刺激征阳性, 无肢瘫。应首先作何种辅助检查来确定诊断

- A. 脑电图
- B. 脑超声血流
- C. 脑动脉造影
- D. 腰穿
- E. 头颅 CT

试题答案: D (此题满分: 1 分)

！！声明：严禁盈利传播！！

15. 男, 33 岁, 2 小时前突然出现剧烈头痛、呕吐。体检: 神清。颈部抵抗, Kernig 征(+)。余神经系统检查阴

性。首先考虑为

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑栓塞
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 高血压脑病

试题答案: D (此题满分: 1 分)

16. 一位耳蜗神经损害患者, 下列哪项症状不正确?

- A. 气导大于骨导(Rinne 试验短阳性)
- B. 高调耳鸣
- C. 可伴前庭神经损害
- D. 常见于氨基糖类抗菌素中毒
- E. Weber 试验偏患侧

试题答案: E (此题满分: 1 分)

17. 有关癫痫病人的工作安排和生活保健, 下列哪项是错误的:

- A. 生活规律化
- B. 不可游泳, 驾车, 飞行, 高空作业
- C. 儿童应照常入学
- D. 成人应参加生产工作
- E. 可以服兵役

试题答案: E (此题满分: 1 分)

18. 蛛网膜下腔出血后必须绝对卧床休息

- A. 1-2 周
- B. 2-3 周
- C. 3-4 周
- D. 4-5 天
- E. 4-6 周

试题答案: E (此题满分: 1 分)

19. 男, 56 岁, 突发言语不清、跌倒在地。小便失禁, 无肢体抽搐。急送至医院急诊室。体检: 昏迷, 瞳孔左侧

6mm, 右侧 3mm, 血压 180 / 110mmHg, 心率 65 次 / 分, 律齐, 最可能的诊断为

- A. 左侧脑出血
- B. 右侧脑出血
- C. 脑外伤(脑内血肿)
- D. 癫痫脑内转移
- E. 脑梗死

试题答案: A (此题满分: 1 分)

！！声明: 严禁盈利传播！！

20. 单纯部分性运动性癫痫的特征是:

- A. 轻微的抽搐发作
- B. 身体某一部分发作性抽搐
- C. 发作性头痛
- D. 发作性多动
- E. 发作性瘫痪

试题答案: B (此题满分: 1 分)

21. 男, 47 岁, 近 3 个月来出现讲话缓慢, 语言低沉, 右手抖动, 右上肢运动迟缓, 精细动作不行, 有一氧化碳

中毒病史, 该患者可能的诊断是

- A. 脑血栓形成
- B. 帕金森病
- C. 脑出血
- D. 帕金森综合征
- E. 特发性震颤

试题答案: D (此题满分: 1 分)

22. 关于腔隙性脑梗塞的诊断, 错误的是:

- A. CT 扫描是病人生前诊断的重要依据
- B. CT 扫描可发现小至 0.1ml 体积的梗塞灶
- C. MRI 能显示后颅凹的小梗死
- D. CT 扫描阴性说明没有腔隙性梗死
- E. CT 扫描对腔隙性梗死的检出率在病后 1 个月内最高

试题答案: D (此题满分: 1 分)

23. 腰髓 2~4 受损害, 临床可以出现哪种深反射消失?

- A. 肱三头肌反射消失
- B. 肱二头肌反射消失
- C. 跟腱反射消失
- D. 膝反射消失
- E. 桡骨膜反射消失

试题答案: D (此题满分: 1 分)

24. 脊髓硬膜外压迫性病变的特点是

- A. 以神经鞘瘤多见, 表现为损痛-脊髓半横断-脊髓全横断损伤过程
- B. 以血管畸形多见, 表现为脊髓蛛网膜下腔出血
- C. 以室管膜瘤多见, 表现为分离性感觉障碍
- D. 以转移瘤多见, 早期局部疼痛显著, 脊髓受压症状出现相对较晚
- E. 以炎症多见, 急性期表现为脊髓休克

试题答案: D (此题满分: 1 分)

！！声明：严禁盈利传播！！

25. 单纯疱疹病毒性脑炎时下列那个部位的病变最重?

- A. 基底核
- B. 颞叶
- C. 枕叶
- D. 脑桥和延髓
- E. 小脑皮质

试题答案: B (此题满分: 1 分)

26. TIA 的病因及发病机理, 目前多数认为与多种因素有关, 不包括下列哪项:

- A. 主动脉一颅脑动脉粥样硬化
- B. 供应脑部的小动脉发生栓塞
- C. 血液动力学, 血液成分异常
- D. 脑静脉窦病变
- E. 颈椎病

试题答案: D (此题满分: 1 分)

27. 下列哪项不符合小舞蹈病的体征

- A 拇指外展征(Warner 征)
- B 旋前肌征
- C 盈亏征
- D 钟摆样膝反射
- E 小写症

试题答案: E (此题满分: 1 分)

28. 蛛网膜下腔出血与各种脑膜炎的鉴别主要依赖于:

- A. 起病形式
- B. 病程长短
- C. 脑膜刺激征
- D. 脑脊液检查
- E. 头颅 CT

试题答案: D (此题满分: 1 分)

29. 患者, 25 岁, 女性, 兴奋、话多一月, 常大声演讲、唱歌、喜打扮, 干涉闲事, 整日忙碌, 彻夜不眠, 就考虑为哪种状态:

- A. 谰妄状态,
- B. 精神错乱状态
- C. 躁狂状态
- D. 紧张性兴奋
- E. 以上都不是

试题答案: C (此题满分: 1 分)

30. 胸段脊髓半切综合征 (Brown-Sequard syndrome) 的运动障碍表现为? A. 病变水平以下对侧肢体中枢性瘫痪

！！声明：严禁盈利传播！！

- B. 病变水平以下同侧肢体周围性瘫痪
- C. 病变水平以下对侧肢体周围性瘫痪
- D. 病变水平以下对侧肢体中枢性瘫痪和肌肉萎缩
- E. 病变水平以下同侧肢体中枢性瘫痪

试题答案: E (此题满分: 1 分)

31. 周期性麻痹的常见病因:

- A. 低钙
- B. 低镁
- C. 低钠
- D. 低钾
- E. 低氯

试题答案: D (此题满分: 1 分)

32. 男, 55 岁。突发头痛、呕吐咖啡色液体, 伴左侧肢体无力, 迅速出现昏迷。既往有高血压病史。最可能的

诊断是

- A. 脑血栓形成
- B. 脑出血
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 脑栓塞
- E. 多发性脑梗死

试题答案: B (此题满分: 1 分)

33. 2 岁男性, 突发脑出血, 头痛, 呕吐, 昏迷, 血压 25 / 12kPa, 应迅速给予

- A 止血治疗
- B 降血压治疗
- C 降颅压治疗
- D 维持生命体征
- E 防治血管痉挛

试题答案: C (此题满分: 1 分)

34. 58 岁男性, 突然右眼失明, 左上肢无力, 2 天后右眼视力好转, 但左侧肢

瘫加重, 查体: 血压 15 / 12kPa, 意识清, 左侧中枢性面舌瘫, 左侧上下肢瘫, 左偏身感觉障碍, 其阻塞血管A 右侧大脑中动脉皮层支

- B 右侧大脑中动脉深穿支
- C 右侧大脑中动脉主干
- D 右侧大脑前动脉深穿支
- E 右侧颈内动脉

！！声明：严禁盈利传播！！

试题答案: E (此题满分: 1 分)

35. 下列哪项符合脑脊液正常值:

- A. 淋巴细胞数  $20 \times 10^6$  个/L
- B. 糖 3.0 mmol/L
- C. 分叶核白血球  $20 \times 10^6$  个/L
- D. 蛋白质 600 mg/L
- E. 氯化物 160 mmol/L

试题答案: B (此题满分: 1 分)

36. 苯妥英钠对癫痫疗效最好的类型是

- A. 小发作
- B. 大发作
- C. 精神运动性发作
- D. 间脑发作
- E. 婴儿痉挛

试题答案: C (此题满分: 1 分)

37. 老年人蛛网膜下腔出血的特点是

- A. 头痛、呕吐严重
- B. 常有抽搐发作
- C. 脑膜刺激征明显
- D. 意识障碍多见, 头痛不明显
- E. 常伴眼底视网膜出血

试题答案: D (此题满分: 1 分)

38. 怀疑重症肌无力的病人, 下列哪项最有意义:

- A. 脑电图
- B. 新斯的明试验
- C. 肌电图神经传导速度
- D. 头颅 CT
- E. 脑脊液检查

试题答案: B (此题满分: 1 分)

39. 关于帕金森病步态描述正确的是

- A. 联带运动减少
- B. 鸭步
- C. 醉酒步态

！！声明：严禁盈利传播！！

- D. 走路快
- E. 身体后倾易跌倒

试题答案: A (此题满分: 1 分)

40. 33. 青年女性, 偏头痛病史 3 年, 半年前, 一次偏头痛发作后头痛渐退时, 出现同侧眼球活动受限, 两周后恢复, 昨日又出现同样症状, 最可能的诊断是 ( )

- A. 偏头痛伴脑供血不足
- B. 偏瘫型偏头痛
- C. 痛性眼肌麻痹
- D. 典型偏头痛
- E. 基底型偏头痛

试题答案: C (此题满分: 1 分)

41. 患者 26 岁, 男性。2 周前感冒, 3 天前背痛, 同时觉双足、小腿发麻, 尚能行走。次日麻木向大腿发展, 走路时双足不灵活, 迈步费劲。小便费劲。检查: 双下肢肌力 1-2 级, 肌张力低, 腱反射对称减低, 病理征阴性。T8 以下各种感觉消失, 下述哪项是最可能的诊断

- A. 脊髓灰质炎
- B. 多发性硬化
- C. 急性横贯性脊髓炎
- D. 脊柱转移性肿瘤
- E. 急性硬膜外脓肿

试题答案: C (此题满分: 1 分)

42. 男, 39 岁, 4 小时前突然剧烈头痛, 伴呕吐多次。体检: 颈部轻度抵抗, 克氏征(+), 布氏征(+), 体温 37.

2℃, 血压 140/80mmHg。其他神经系统检查阴性。诊断首先考虑

- A. 脑膜炎
- B. 脑炎
- C. 脑出血
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 偏头痛

试题答案: D (此题满分: 1 分)

43. 右侧中枢性舌肌瘫痪的表现有: A.

伸舌偏向病灶同侧 B. 伸舌偏向病灶对侧

## ！！声明：严禁盈利传播！！

- C. 左侧舌肌萎缩及纤颤                            D. 右侧舌肌萎缩及纤颤  
E. 伸舌无偏斜

试题答案: A (此题满分: 1 分)

44. 急性脑血管病(卒中)中, 发病最快的是

- A. 高血压脑病                                    B. 脑出血    C. 脑血栓形成  
D. 脑栓塞    E. 蛛网膜下腔出血

试题答案: D (此题满分: 1 分)

45. 格林巴利(吉兰-巴雷)综合症病例, 起病前常有

- A. 药物中毒史                                    B. 感染病史    C. 家族史  
D. 糖尿病史    E. 外伤史

试题答案: B (此题满分: 1 分)

46. 急性横贯性脊髓炎和格林-巴利综合征的鉴别点是

- A. 四肢瘫    B. 腱反射消失  
C. 肌张力低    D. 无病理征  
E. 括约肌障碍

试题答案: E (此题满分: 1 分)

47. 男性, 26岁, 突然出现从一侧手指开始的抽动, 向腕部、臂、肩部及半身扩展。最可能的诊断是:

- A. 全面性强直一阵挛发作  
B. 精神运动性发作  
C. 失神发作  
D. Jackson 癫痫  
E. 部分性感觉性发作

试题答案: D (此题满分: 1 分)

48. 患者, 发热1周, 逐渐不认家人, 躁动不安, 言语增多, 错乱, 常有幻觉, 查体: 查体不能合作, 定向力障碍, 注意力分散, 最可能的意识障碍类型是A:醒状昏迷 B:意识模糊 C:谵妄状态 D:闭锁状态 E:以上都不是

试题答案: C (此题满分: 1 分)

49. 男, 70 岁, 晨起时出现头晕、右侧肢体无力, 约半小时后症状完全消失。头颅 CT 检查正常。临床诊断为

- A. 脑血栓形成
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 脑出血
- D. 脑栓塞
- E. 蛛网膜下腔出血

试题答案: B (此题满分: 1 分)

50. 眩晕性癫痫发作的病灶在:

- A. 额叶
- B. 顶叶
- C. 颞叶
- D. 枕叶
- E. 岛叶

试题答案: C (此题满分: 1 分)

51. 脑电图检查对下列哪种病的诊断意义最大?

- A. 脑梗塞
- B. 脑炎
- C. 面神经炎
- D. 三叉神经痛
- E. 癫痫

试题答案: E (此题满分: 1 分)

52. 女 12 岁一星期前感冒, 3 天来进行性四肢无力, 查体温正常四肢周围性瘫痪远端重于近端, 肌力 1 级, 无肌痛, 早晚肌力无变动。下列检查中, 关系最密切

- A. 血清钾浓度
- B. 血清钠浓度
- C. 新斯的明试验
- D. 运动神经传导速度检查
- E. 血沉

试题答案: D (此题满分: 1 分)

53. 颈内动脉系统短暂性脑缺血发作的症状可有

- A. 阵发性眩晕
- B. 复视
- C. 交叉性瘫痪
- D. 吞咽困难
- E. 运动性失语

试题答案: E (此题满分: 1 分)

！！声明：严禁盈利传播！！

54. 双侧旁中央小叶及其附近中央前后回受损引起

- A 下肢感觉障碍
- B 下肢瘫痪
- C 面舌及上肢感觉障碍
- D 面舌及上肢瘫痪
- E 痉挛性截瘫, 传导束性感觉障碍及尿潴留

试题答案: E (此题满分: 1 分)

55. 女孩, 7岁, 发作性短暂意识不清半年, 发作时呼之无反应, 两眼瞪视, 约数秒钟恢复意识, 清醒后对发作无记忆, 无四肢抽搐及强直, 发作频繁, 每天多时可达十多次。体格检查及神经系统检查未发现异常。诊断首先考虑: A 泛化性强直一阵挛发作

- B 复杂部分性发作
- C 失张力发作
- D 失神发作
- E 假性癫痫发作

试题答案: D (此题满分: 1 分)

56. 感觉系统检查时最值得注意的情况是:

- A. 有无感觉异常
- B. 有无疼痛
- C. 障碍的程度
- D. 感觉障碍的部位
- E. 有无感觉过敏

试题答案: D (此题满分: 1 分)

57. 椎-基底动脉系统脑梗死, 最佳的辅助检查是

- A. 头颅 CT
- B. 头颅磁共振(MRI)
- C. 脑电图
- D. 腰椎穿刺
- E. 经颅多普勒超声

试题答案: B (此题满分: 1 分)

58. 女, 40岁, 突然头痛, 左上睑下垂, 不能睁开, 左眼球外展位, 不能向上、下、内转动, 瞳孔扩大, 直接、间接对光反射消失, 病变损害了

- A. 左侧面神经
- B. 左动眼神经
- C. 左视神经

- D. 左侧三叉神经
- E. 左侧外展神经

试题答案: B (此题满分: 1 分)

59. 导致腱反射亢进的病损部位为

- A 脊神经后根
- B 脊髓前角
- C 脊髓后索
- D 锥体束
- E 锥体外系

试题答案: D (此题满分: 1 分)

60. 一侧颈内动脉闭塞, 可无临床症状, 是因为

- A 同侧颈外动脉未闭塞
- B 对侧颈内动脉未闭塞
- C 正常脑底动脉环可迅速建立侧支循环
- D 双侧椎动脉未闭塞
- E 颅内血管变异

试题答案: C (此题满分: 1 分)

61. 一女性, 48 岁, 有既往亚急性心内膜炎病史, 突发意识模糊右上肢及嘴抽搐, 且发热, 听诊心脏音增强, 首先应怀疑:

- A. 脑出血
- B. 心肌梗塞
- C. 脑栓塞
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 脑膜炎

试题答案: C (此题满分: 1 分)

62. 女 20 岁右面肌无力 3 天, 诊断面神经炎, 最近有溃疡病出血史, 问下列何种治疗措施暂不宜

- A. 强的松 30mg/日, 一疗程
- B. 茎乳孔附近超短波透热疗法
- C. 针刺
- D. 保护右眼角膜
- E. 神经营养代谢药

试题答案: A (此题满分: 1 分)

63. 对于多发性硬化患者, 下列哪项实验室检查是不恰当的:

- A. 头颅 MRI 检查;
- B. 腰穿脑脊液检查;
- C. 诱发电位检查;
- D. 头颅 CT 检查;
- E. 自身免疫血清学检查

！！声明：严禁盈利传播！！

试题答案: D (此题满分: 1 分)

64. 患肢可抬离床面, 但是不能对抗阻力, 其肌力为

- A. I 级
- B. II 级
- C. III 级
- D. IV 级
- E. V 级

试题答案: C (此题满分: 1 分)

65. 某病人因外伤致使脊髓腰 1 节段右侧半横断, 损伤平面以下会出现

- A. 右侧痛温觉丧失
- B. 右侧粗触觉丧失
- C. 左侧本体感觉丧失
- D. 右侧本体感觉丧失
- E. 左侧肢体随意运动丧失

试题答案: C (此题满分: 1 分)

66. 癫痫的定义是

- A. 持续存在的神经系症状
- B. 发作性抽搐
- C. 中枢神经系统内存在破坏性病变
- D. 反复发作的脑部神经元过度放电引起阵发的, 短暂的大脑功能障碍
- E. 突然神志丧失

试题答案: D (此题满分: 1 分)

67. 一 40 岁女性, 2 年来反复出现视力下降、右侧肢体偏瘫, 最近 1 周又出现饮水呛咳、口齿不清。

患者可能的诊断为:

- A. 脑梗塞; B. 视神经脊髓炎; C. 多发性硬化; D. 颅内感染; E. 球后视神经炎

试题答案: C (此题满分: 1 分)

68. 脊髓前角细胞病损的瘫痪特点

- A 单瘫
- B 节段型分布的弛缓性瘫, 伴感觉障碍

！！声明：严禁盈利传播！！

- C 节段型分布的弛缓性瘫, 不伴感觉障碍
- D 四肢远端肌肉瘫痪
- E 截瘫

试题答案: C (此题满分: 1 分)

69. 上运动神经元损害的临床表现是:

- A. 显著的肌萎缩
- B. 肌束颤动
- C. 膝反射消失
- D. 肌张力减低
- E. 可引出 Babinski 征

试题答案: E (此题满分: 1 分)

70. 有关急性脑血管病的病变部位, 下列何者是不正确的

- A 脑血栓形成最易发生在大脑中动脉
- B 脑栓塞以大脑中动脉阻塞最常见
- C 脑出血的血管最多在豆纹动脉
- D 脑桥出血多由基底动脉的旁正中动脉破裂所致
- E 蛛网膜下腔出血以大脑凸面畸形血管破裂最多见

试题答案: E (此题满分: 1 分)

71. 患者, 男, 18 岁, 10 天前感冒, 2 周来逐渐感四肢无力, 受凉时较重, 检查颅神经正常, 四肢近端肌力较远端差, 有压痛, 肌力 4-5 级, 腱反射低, 无病理反射, 无疲劳现象, 下列检查中什么与本病关系不大:

- A. 腰穿查 CSF 蛋白, 细胞
- B. 查 CPK
- C. 肌电图
- D. 血沉和抗 “O”
- E. 血钾

试题答案: E (此题满分: 1 分)

72. 下列哪个反射对应的脊髓节段错误

- A. 肱二头肌反射-颈 5、6
- B. 肱三头肌反射-颈 6、7
- C. 膝腱反射-腰 2、4
- D. 跟腱反射-骶 1、2
- E. 跖反射-骶 3、4

试题答案: E (此题满分: 1 分)

73. 关于咖啡因麦角胺, 下列哪些是正确的

- A. 可用于不常发作的强烈的偏头痛发作早期

**！ ! 声明: 严禁盈利传播! !**

- B. 每日服量不超过 6 片
- C. 每周服量不超过 6 片
- D. 严重心血管、肝、肾疾病者禁用
- E. 可用于偏瘫型, 眼肌瘫痪型和基底动脉型偏头痛

试题答案: C (此题满分: 1 分)

74. 一位胸椎结合患者, 表现为截瘫、胸 5 以下平面感觉障碍病变部位相当于:

- A. 第 2 胸椎
- B. 第 3 胸椎
- C. 第 4 胸椎
- D. 第 5 胸椎
- E. 第 6 胸椎

试题答案: B (此题满分: 1 分)

75. 精神运动性癫痫的特征是

- A. 发作性昏睡
- B. 发作性抽搐及意识障碍
- C. 发作性精神症状伴有一过性意识障碍
- D. 持续存在的精神异常, 发作性加重
- E. 发作性精神症状

试题答案: C (此题满分: 1 分)

76. 蛛网膜下腔出血体征方面最主要的是:

- A. 一侧颅神经麻痹
- B. 脑膜刺激征
- C. 偏瘫
- D. 玻璃体下片状出血
- E. 某一肢体轻瘫或感觉障碍

试题答案: B (此题满分: 1 分)

77. 结核性脑膜炎的以下哪项表述是错误的

- A、急性或亚急性起病
- B、颈强、Kerning 征等脑膜刺激征明显
- C、脑脊液细胞数、蛋白升高, 糖和氯降低
- D、常用氟康唑、异烟肼、糖皮质激素等治疗
- E、脑脊液离心沉淀涂片墨汁染色 (-)

试题答案: D (此题满分: 1 分)

78. 对多数蛛网膜下腔出血, 防止再出血的根本方法是

- A 卧床休息 4~6 周

！！声明：严禁盈利传播！！

- B 保持大便通畅
- C 不再从事剧烈运动或重劳动
- D 保持血压稳定
- E 对先天性动脉瘤或脑血管畸形行手术治疗

试题答案: E (此题满分: 1 分)

79. 女 17 岁, 夜间吹电扇后起床时发现说话时口角向左歪, 右口角流口水, 问作面神经功能检查时, 下列何种症状不应出现?

- A. 右鼓腮漏气
- B. 左睑裂比右侧小
- C. 右鼻唇沟浅
- D. 张口下颌向右侧偏倚
- E. 右侧舌味觉减退

试题答案: D (此题满分: 1 分)

[david03.top](#) 分享, 未经允许不得转载转卖

**!! 声明: 严禁盈利传播!!**

## 二、病例分析题 (根据下面的案例的要求, 请对该案例做出分析解答)

80.

病史简介:

患者女性, 65 岁, 有高血压 10 年, 糖尿病 8 年, 因突发右侧肢体无力并言语不清 2 小时入院。患者晚上看电视时突发右侧肢体无力, 站立不能, 言语含糊不清, 不伴头痛、恶心, 二便正常。入院

后查体: 神志嗜睡, 血压 170/96mmHg, 混合性失语, 右侧鼻唇沟浅, 伸舌右偏, 右上、下肢肌力 0 级, 肌张力低, 腱反射减弱, 右侧 Babinski 征阴性。头颅 CT 未见明显异常密度影。

请讨论: 1、定位诊断及定性诊断?

2、鉴别诊断?

3、提出进一步检查及治疗方案?

试题答案:

请讨论:

定位诊断及定性诊断?

定位诊断: 患者因言语不能, 右侧肢体无力 3 小时入院, 病灶位于左侧大脑半球, 根据查体: 言语不能 (左侧 Broca 区), 双眼向左侧凝视 (左侧皮质侧视中枢), 右侧中枢性面舌瘫, 右侧肢体肌

力 0 级, 肌张力降低, 腱反射减弱, 右侧下肢病理征可疑(左侧锥体束)。定位于左侧大脑半球(左侧大脑中动脉供血区)。(2 分)

定性诊断: 根据患者为中老年女性, 突发起病; 右侧肢体肌力为 0 级, 嗜睡, 头颅 CT 未见高密度影, 排除脑出血, 定性为缺血性脑血管病(脑梗死或脑栓塞)。(2 分)

鉴别诊断?

鉴别诊断:

(1). 脑出血: 支持点: 老年女性, 急性起病, 高血压病史, 偏瘫较严重, 发病时血压升高。不支持点: 头颅 CT 未见高密度影, 无明显意识障碍。结论: 可排除(1 分)

(2). 脑栓塞: 支持点: 有心房纤颤病史, 急性起病, 病情迅速达到高峰。不支持点: 无癫痫, 起病时血压增高明显。结论: 进一步检查以排除(1 分)

提出进一步检查及治疗方案?

进一步检查: 头颅 MRI 及 MRA(DWI), DSA、心电图、血生化(血糖、血脂、尿酸、同型半胱氨酸等高危因素)、凝血功能, 心脏彩超、TCD 发泡试验、颈动脉超声。(2 分)

治疗方案:

对症治疗: (2 分)

1. 缺血性卒中后血压升高通常不需要紧急处理, 病后 24~48 小时收缩压  $>200\text{mmHg}$ 、舒张压  $>110\text{mmHg}$  时可用降压药, 切忌过渡降压使脑灌注压降低, 导致脑缺血加剧;

准备溶栓血压控制在 180/100mmHg 以下。

2. 意识障碍和呼吸道感染者宜选用适当抗生素控制感染, 保持呼吸道通畅、吸氧和防治肺炎、预防尿路感染和褥疮等;

3. 心电监测

4. 血糖控制在 7.7~10mmol/L, 如  $>10\text{mmol/L}$  宜给予胰岛素治疗

5. 营养支持。

特异性治疗: (3 分)

1. 静脉溶栓: 溶栓时间窗内(发病 4.5 小时以内可以用重组组织型纤溶酶原激活物; 发病 4.5~6 小时, 或者发病 4.5 小时以内不具备 rtPA 溶栓的条件可以用尿激酶), 年龄 18 岁以上, 已排除颅内出血; 患者本人或家属同意。

2. 血管内介入治疗: 包括机械取栓、动脉溶栓、动脉成型术等。对 rtPA 标准静脉溶栓治疗无效的大血管闭塞者, 在发病 6 小时以内可补救机械取栓等治疗; 对发病 6~24 小时的前循环大血管闭塞者, 符合特殊条件也可机械取栓。

3. 抗血小板治疗: 阿司匹林 100~300mg/d, 波立维 75mg/d。小卒中启动双重抗血小板治疗 21 天; 溶栓者应在 24 小时复查头颅 CT 未见脑出血后应用。

4. 抗凝治疗: 房颤合并急性脑梗死发病后 4~14 天开始抗凝治疗。合并高凝状态、深静脉血栓和肺栓塞风险时, 可预防性使用抗凝治疗。

5. 扩容治疗: 纠正低灌注, 适用于血流动力学机制所致的脑梗死。

6. 脑保护治疗: 自由基清除剂、兴奋性氨基酸受体阻滞剂等。药物可用胞二磷胆碱、依达拉奉。

7. 早期康复治疗。

8. 中医、中药治疗。

外科治疗: (1 分)

脑疝形成征象者, 开颅去骨瓣减压术

[david03.top](#) 分享, 未经允许不得转载转卖

**！！声明：严禁盈利传播！！**

三、 简答题 (根据提问, 请简要回答下列问题。 )

81. 简述脑出血和脑血栓形成的鉴别诊断要点

试题答案:

1、发病方式:脑出血为急性起病;脑血栓形成起病相对较缓。2、发病时情况:脑出血多在活动、血压骤升等情况下起病; 脑血栓形成多在安静、睡眠血压下降等情况下起病。3、病史:脑出血多有高血压病史; 脑血栓形成可有高血压病、糖尿病、高脂血症等病史。4、临床表现:前者有头痛, 呕吐等高颅压症状, 可有脑膜刺激征;后者多无高颅压症状, 无脑膜刺激征。5、CT:脑出血为高密度病灶, 脑梗塞为低密度病灶。

(此题满分: 5 分)



82. 试述化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、病毒性脑膜炎和隐球菌性脑膜炎的脑脊液变化特点。

试题答案: 脑脊液      化脓性脑膜炎      结核性脑膜炎      病毒性脑膜炎  
(脑)炎      隐球菌性脑膜炎

压力	高	较高	正常或稍高	高
外观 或稍浑浊	浑浊	稍浑浊	清亮或稍浑浊	清亮
潘氏试验	2+~3+	1+~2+	±~2+	1+~ 3+
白细胞数 增高, 10^5/00	>500~1000	50~500	正常或轻度增高	轻度
蛋白 (G/L) 增高	1~5, 少数>10	增高, 1~2	正常或轻度增高	轻度
糖	明显降低或消失	降低	正常或稍降低	降低
氯化物 或降低	正常或降低	明显降低	正常	正常
病原检查 染色或培养可见隐球菌 (此题满分: 5 分)	可发现细菌	可找到抗酸杆菌	病毒血清学阳性	墨汁

83. 试述重症肌无力患者肌无力危象的处理

- 试题答案:
1. 维持呼吸道通畅
  2. 对肌无力危象者先肌注新斯的明然后渐改为口服剂
  3. 如出现胆碱能危象者应即停用抗胆碱酯酶剂. 并静注阿托品, 直至腾喜龙试验阳性后, 再给适量口服剂
  4. 视情况气管切开辅助呼吸
  5. 抗感染予静脉补液, 维持水, 电解质平衡
  6. 血浆交换疗法
  7. 大剂量丙球静脉滴注
- (此题满分: 5 分)

四、X型题 (不定项选择题, 每道题下面均有五个备选答案, 其中至少有一个备选答案是正确的, 请将正确的答案挑选出来, 并在显示器选择相应的答案或在答题卡上相应位置涂黑, 以示正确回答。多选或少选均不得分。)

84. 脑血栓形成的病因有:

- A. 脑动脉粥样硬化      B. 各种脑动脉炎      C. 颅内夹层动脉

瘤

E. 真性红细胞增多症

D. 结缔组织病

试题答案: A, B, C, D, E (此题满分: 1 分)

[david03.top](#) 分享, 未经允许不得转载转卖

！！声明：严禁盈利传播！！

DavidYR